



Fig. 1. Nutlets. Upper *Trichodesma formosanum*. Lower *T. calycosum*. $\times 3$.

らかに異なり、台湾特産の種類として区別してよいと思う。

Brand (1921) は *T. calycosum* が花喉に 10 個の突起があるが、*Trichodesma* の他のものにはこれがないことから、*Lacaitaea* という別属とした。台湾のものも 10 個の突起があり *Lacaitaea* に属すものである。然し *Lacaitaea* と *Trichodesma* とは外観が非常によく似ているので、Handel-Mazzetti や Johnston は、別属とすることを認めていない。*Trichodesma* の分果は卵形で平滑かときに両端にかぎ状の突起をもつのに対し、*Lacaitaea* は背面に輪状の膜をもつ点で異っている。分布地域も異なる

ので *Lacaitaea* は特殊な群ではあるが、上記の特徴だけで属をわけるのは疑問がある。

Trichodesma formosanum Matsumura in Bot. Mag. Tokyo 12: 108 (1898)
—*Trichodesma khasianum* (non C. B. Clarke) Henry, List Pl. Formos. p. 63 (1895); Matsumura et Hayata, Enum. Pl. Form. p. 258 (1906); Ding How in Taiwan 1: 212 (1950). Distr. Central and southern Formosa.

Hab. Pref. Taichu: In mountains (Y. Tashiro no. 35, Type in TI). Pref. Nantow: Chichichieh 集集衛—Rinchimu (C. Owatari); Chitou 溪頭 (T. C. Huang no. 2075). Pref. Chiayi: Bunkiko (Faurie no. 1394). Pref. Hualien: Mukuatan 木瓜潭 (B. Hayata). Pref. Taitung: Murimuribuckisha (Leg. ?, Dec. 1899). Pref. Pingtung: Subotansha (C. Owatari); Checheng 車城 (S. Nagasawa no. A. 606); The costal region around Sheting 項社 (T. Shimizu no. 12170). Bankinsing (Faurie no. 799). (東京大学理学部 植物学教室)

正 誤 (Errata)

頁 (Page)	行 (Line)	誤 (For)	正 (Read)
Vol. 44: 380	35	ベンニシラ	ベン＝シラリ
”	”	シラス	シラリ
381	2	Ecclesiasticus	Ecclesiastices.